

Packungsbeilage Beaphar Flohband Katze - 6 Monate

Diazinon Flohband Katze rot. Diazinon 15% w/w.

Anwendungsgebiet: Bekämpfung von Flöhen (*Ctenocephalides felis*) bei Kurzhaarkatzen.

Sicherheitsmechanismen: Das Band enthält einen Sicherheitsmechanismus. Falls die Katze irgendwo mit dem Halsband hängen bleibt, dehnt sich das Halsband und gleitet über den Kopf der Katze. So kann sich das Tier nicht verletzen.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei kranken Tieren oder Tieren, die sich in der Rekonvaleszenzphase befinden, Tieren mit eingeschränkter Leberfunktion oder Tieren, die empfindlich auf Organophosphorverbindungen reagieren, oder Tieren, die jünger als sechs Monate sind.

Nebenwirkungen: In einigen Fällen kann eine Reizung der Haut am Hals durch das Tragen des Halsbandes auftreten. Sollten Sie dergleichen bemerken, ist das Halsband zu entfernen, bis die Symptome ohne eine spezifische Behandlung abgeklungen sind. Insofern schwerwiegende Symptome auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage beschrieben sind, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt hierüber.

Dosierung und Anwendung: Verwenden Sie je ein Halsband pro Tier. Das Flohband erreicht seine optimale Wirkung nach zwei bis vier Tagen und hält während der nächsten sechs Monate an. Befestigen Sie das Halsband locker um den Hals Ihrer Katze. Ist das Band zu eng angelegt, kann das zu Hautreizungen führen. Schneiden Sie den überstehenden Teil des Bandes ab. Berücksichtigen Sie dabei ein eventuelles Wachstum des Tieres. Das Halsband ist wasserbeständig. Wird das Band infolge von Regen oder Waschen nass, hat das keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Bandes.

Aufbewahrungs- und Entsorgungsmaßnahmen: Nicht über 25 °C lagern. In der Originalpackung aufbewahren. Nicht im Kühl- oder Gefrierschrank lagern. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfälle hiervon müssen gemäß der regionalen Bestimmungen entsorgt werden.

Besondere Warnhinweise: Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Diazinon wird nicht empfohlen, dieses Produkt zu verwenden. Der Kontakt mit der Haut ist auf ein Minimum zu begrenzen. Nach dem Anlegen sollten die Hände gewaschen werden. Bei oraler Aufnahme sofort einen Arzt aufsuchen und diesem die Verpackung vorzeigen. Es liegen keine ausreichenden Studien über eine Anwendung bei weiblichen Katzen während der Trächtigkeit und in der Laktationsphase vor. Deshalb wird eine Anwendung in dieser Zeit nicht empfohlen. Diazinon gehört zu den Organophosphorverbindungen. Wenden Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Organophosphor- und Carbamat-Insektiziden an.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ausschließlich zur Anwendung als Tierarzneimittel geeignet