



# ENDOARD PLUS UND PLUS XL

SCHMACKHAFTE TABLETTEN FÜR HUNDE



Entwurmungsmittel mit einem breiten Spektrum

Einfache Dosierung, auch für kleinere Hunde

Schmackhafte Tabletten; einfache Gabe dank Rindfleischgeschmack



Teilbare Tablette

## ZUSAMMENSTELLUNG

Endogard Plus:

Praziquantel 50 mg  
Pyrantel 144 mg  
Febantel 150 mg

Endogard Plus XL:

Praziquantel 175 mg  
Pyrantel 504 mg  
Febantel 525 mg

## VERPACKUNG

Endogard Plus: 30 oder 100 Tabletten

Endogard Plus XL: 12 Tabletten

## INDIKATIONEN

Hunde:

Zur Behandlung von einer der Wurmartarten bei erwachsenen Hunden, die im Folgenden aufgelistet werden:

Nematoden:

Askariden: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (alle Stadien);  
Hakenwürmer: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (erwachsenes Stadium)

Cestoden:

Bandwürmer: *Taenia spp*, *Dipylidium caninum*

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Empfohlene Dosis: 15 mg/kg Febantel, 14,4 mg/kg Pyrantel und 5 mg/kg Praziquantel:

Endogard Plus: 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht

Endogard Plus XL: 1 Tablette pro 35 kg Körpergewicht

Teilbare Tabletten. Die Tabletten können oral oder mit dem Futter verabreicht werden.

# ENDOGARD PLUS UND PLUS XL

## SPECTRUM

Wurmart	Zeitraum	Infektionsweg	Symptome
Askariden	4-6 Wochen	oral, intrauterin, Milch	Husten
Hakenwürmer	2 Wochen	oral, Haut, Milch	Husten, hämorrhagischer Durchfall -> Anämie, Dehydrierung und Tod
Peitschenwürmer	10 Wochen	oral	Chronischer Durchfall, Anämie und Gewichtsverlust
Cestoden	4-6 Wochen	oral	Asymptomatisch, analer Juckreiz

**Praziquantel:** zerstört die Schutzschicht der Cestodes, so dass die Bandwürmer nicht mehr gegen die Verdauungsprozesse des Wirtes geschützt sind. Wirksam gegen Taeniae-Arten, Dipylidium und Echinokokken.

**Pyrantel:** ist ein cholinerges Agonist, der eine spastische Paralyse bei den Nematoden verursacht (Trichuris und Ascaris).

**Febantel:** hemmt die Polymerisation von Tubulin in den Mikrotubuli der Nematoden (einschließlich der Hakenwürmer). Dies verursacht strukturelle und funktionelle Störungen, die innerhalb von 2-3 Tagen zum Tod des Parasiten führen.



### Endogard Plus und Plus XL Tabletten für Hunde

Zusammensetzung: Endogard Plus Flavour: Praziquantel 50 mg - Pyrantelmonat 144 mg - Febantel 150 mg. Endogard Plus XL: Praziquantel 175 mg - Pyrantelmonat 504 mg - Febantel 525 mg. Indikationen: Zur Behandlung von einer der Wurmart bei erwachsenen Hunden, die im Folgenden aufgelistet werden: Nematoden: Spulwürmer: Toxascaris leonina (spätes Larvenstadium und adultes Stadium); Hakenwurm Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adultes Stadium); Cestoden: Bandwürmer: Taenia spp, Dipylidium caninum. Kontraindikationen: nicht bei Welpen verwenden, die jünger als 2 Wochen sind oder weniger wiegen als 2 kg. Nicht gleichzeitig mit Piperazin-Verbindungen anwenden. Nicht bei Hunden mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe oder der Hilfsstoffe verwenden. Bei schwangeren Hündinnen die angegebene Dosierung nicht überschreiten. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann bei Welpen vorübergehend dünner Stuhl, Durchfall und/oder Erbrechen auftreten. Wenn Sie ernste oder andere Nebenwirkungen beobachten, kontaktieren Sie bitte einen Tierarzt. Dosierung und Anwendung: oral. Empfohlene Dosierung: 15 mg Febantel pro kg Körpergewicht, 14,4 mg Pyrantel pro kg Körpergewicht und 5 mg Praziquantel pro kg Körpergewicht. Kleine und mittlere Hunde: Endogard Plus: 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht. Die Tabletten sind in zwei oder vier gleich große Teile teilbar. Große und sehr große Hunde: Endogard Plus XL: 1 Tablette pro 35 kg Körpergewicht. Die Tabletten können halbiert werden. Die Tabletten können direkt verabreicht werden. Es sind keine Diätmaßnahmen erforderlich. Vertreter: Niederlande, 3770 Virbac AH Barneveld. Nummer: Endogard Plus REG EN 104801. Endogard Plus XL REG EN 104802.

Virbac Niederlande BV | Postfach 313 | 3770 AH Barneveld  
info@virbac.nl | www.virbac.nl | Tel. 0342 427 127

**Virbac**  
ANIMAL HEALTH

Your Partner in Animal Health