



Wo kommen Flöhe am häufigsten vor?



Wo kommen Zecken am häufigsten vor?



Wann sind Flöhe am aktivsten?



Wann sind Zecken am aktivsten?



Prävention	Kontrolle	Bekämpfung
Anti-Flohmittel: Pipette, Halsband oder Spray.	Bei Kratzen, Juckreiz oder übermäßigem Lecken das Fell mit einem Flohkamm kontrollieren.	Anti-Flohmittel: Pipette, Halsband oder (Umgebungs-)Spray.

Prävention	Kontrolle	Entfernen
Zeckenabwehrprodukte: Pipette, Halsband oder Spray.	Überprüfen Sie Ihr Haustier täglich. Besonders: Achseln, Leisten und Ohren.	Entfernen Sie die Zecke so schnell wie möglich mit einer Zeckenzange oder einem -haken.

Innerhalb von 24 Stunden

Wann haben Sie Ihr Tier das letzte Mal vor Flöhen und Zecken geschützt?

Verwenden Sie den praktischen Medpets-Kalender, um zu wissen, wann Ihr Tier wieder geschützt werden muss.

Januar	Februar	März
April	Mai	Juni
Juli	August	September
Oktober	November	Dezember

Zecken...

- ... kommen in Wäldern, Mooren, Dünen, Parks und Gärten vor.
- ... saugen Blut und können Borreliose übertragen.
- ... sind das ganze Jahr über, aber meist bei Temperaturen von bis zu 7 °C aktiv.
- ... können mit dem richtigen Schutz, wie z.B. einem Pipetten-Mittel, einem Spray oder einem Halsband abgewehrt werden.
- ... sollten nach dem Biss so wie möglich schnell entfernt werden, um Krankheiten zu verhindern.

Flöhe...

- ... leben auf der Haut Ihres Tieres und die Eier, Larven und Puppen vor allem in der Umgebung Ihres Tieres.
- ... verursachen einen lästigen Juckreiz, der zu schlimmeren Problemen führen kann.
- ... kann man mit einem Flohkamm aufspüren und mit einem Pipetten-Mittel, einem Spray oder einem Halsband fernhalten oder töten.
- ... Eier, Larven und Puppen befinden sich meist im Haus, vergessen Sie nicht ein Umweltspray anzuwenden.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.medpets.de
 Noch Fragen? Unsere Tierärztin berät Sie kostenlos!

