

Exil No Worm CF

Paste gegen Würmer für Hunde und Katzen

TIERARZNEIMITTEL

Reg. NL 7997

ZUSAMMENSETZUNG PRO ML

Niclosamid: 240 mg, Oxibendazol: 30 mg

ZIELTIER

Hunde und Katzen aller Altersstufen.

HINWEIS

Infektionen bei Hunden und Katzen aller Altersstufen mit:

- *Spulwürmer*: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*.
- *Bandwürmer*: *Dipylidium* spp. en *Taenia* spp.
- *Peitschenwürmer*: *Trichuris vulpis*.
- *Hakenwürmer*: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*.

Gebrauchsanweisung

1 ml Pasta pro 2 kg Körpergewicht in einer einzelnen Dosis auf den Rücken der Zunge auftragen. Die erforderliche Menge kann auch ins Futter gemischt werden.

DOSIERUNG

Injektor 5 ml: 1 Dosierstreifen entspricht 0,5 kg Hund/Katze

Injektor 10 ml: 1 Dosierstreifen entspricht 2,0 kg Hund/Katze

Injektor 25 ml: 1 Dosierstreifen entspricht 10 kg Hund/Katze

NEBENWIRKUNGEN

Nebenwirkungen sind selten.

HINWEISE

Trächtige Tiere nicht entwurmen. Wegen möglichen Überempfindlichkeiten sollte ein Hautkontakt vermieden werden. Darum tragen Sie bitte (Haushalts-)Handschuhe. Da es nach der Anwendung zum Erbrechen oder Würgen kommen kann, sollte eine Anwendung auf Teppichen oder in der Nähe von Textilien vermieden werden.

Eventuelle Flecken sofort mit lauwarmen Wasser ohne Reinigungsmittel rausreiben.

HALTBARKEIT

Haltbar bis zum Datum, welches auf der Verpackung vermeldet ist. Trocken, bei Zimmertemperatur (15-25 °C) und Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

ZULASSUNGSINHABER:

Bridgefarma B.V. PRODUZENT: Alfamed, France

Exil Diergeneesmiddelen

Divisie van Emax Nederland

BV Postbus 365, 3770 AJ Barneveld

Huisdier Informatie Centrum:

Tel 0900 2000 888 (€0,20/min) www.emax.nl

ALLGEMEINE HINWEIS ZU WÜRMERN

Behandlungsempfehlung Hund

- Welpen: Entwurmung im Alter von 2, 4, 6, 8 Wochen später im Alter von 3, 4, 5, 6 Monate danach 4 x pro Jahr
- Erwachsene Tiere: mindestens 4 x im Jahr entwurmen
- Laktierenden Hündinnen: 2 und 4 Wochen nach dem Wurf; dann mindestens 4 x pro Jahr
- Zwinger: alle Hunde 4-6 x pro Jahr entwurmen

Behandlungsempfehlung Katze

- Kätzchen: Entwurmung im Alter von 3, 5, 7, 9 Wochen dann im Alter von 3, 4, 5, 6 Monate danach 4 x pro Jahr
- Erwachsene Tiere: mindestens 4 x im Jahr entwurmen
- Stillende Katzen: 3 bis 5 Wochen nach dem Wurf; dann mindestens 4 x im Jahr

Diese Angaben richten sich nach den europäischen Richtlinien ESCCAP.

WÜRMER BEI HUND UND KATZE

Für Hunde und Katze sind vor allem zwei Wurmart von Bedeutung, diese erkennen Sie folgendermaßen:

- Spulwürmer: lange, runde, dünne Würmer
- Bandwürmer: (bewegende) weiße Ei-Pakete im Stuhl

Für ein optimales Ergebnis müssen Sie Spulwürmer und Bandwürmer auf unterschiedliche Art und Weise behandeln.

In dieser Broschüre erfahren Sie wie.

DER SPULWURM

Hunde und Katzen haben eigene Spulwürmer. Spulwürmer sind lang, rund und dünn. Sie sind vor allem ein Problem bei jungen Tieren.

Was Sie über den Spulwurm wissen sollten

Welpen und Kätzchen werden bereits in der Gebärmutter und/oder über die Muttermilch infiziert.

Hunde oder Katzen können sich auch durch das Auflecken der Eier infizieren, denn diese verbreiten sich in der Umgebung.

Was tun bei einer Spulwurm-Infektion?

Behandeln Sie alle Ihre Hunde und Katzen mit einem Wurmmittel. Tiere unter 6 Monaten vorzugsweise mit Exil No Worm.

DER FLOHBANDWURM

Der Flohbandwurm (*Dipylidium caninum*) kommt u.a. bei Hund und Katze vor. Dieser Bandwurm wird durch Flöhe übertragen. Ein infizierter Hund oder eine infizierte Katze ist an den Ei-Paketen zu erkennen, die sich im Stuhl befinden.. Sie sehen aus wie (bewegende) weiße Reiskörner.

Was Sie über den Flohbandwurm wissen sollten

Ihr Haustier verbreitet die Bandwurmeier in Ihrem Haus. Diese Eier werden von den Nachkommen des Flohs (Flohlarven) gefressen, denn diese leben auch in Ihrem Haus. Nach einigen Wochen entwickelt sich die, mit Bandwurm infizierte, Flohlarve zu einem infizierten erwachsenen Floh. Dieser infizierte erwachsene Floh springt auf Ihr Haustier. Ihr Haustier kratzt und leckt sich und nimmt hierdurch den Floh samt Bandwurm auf. Im Darm Ihres Haustieres angekommen wächst der junge Bandwurm zu einem erwachsenen Bandwurm heran. Der Kreislauf schließt sich.

Merke:

Hund/Katze mit Bandwurm → Bandwurmei → gefressen von Flohlarve → infizierter erwachsener Floh →

Hund/Katze frisst Floh → Hund/Katze mit Bandwurm

Dieser Bandwurm wird nur durch Flöhe (und Läuse) übertragen und nicht durch Fliegen etc.

Was tun bei einer Bandwurm-Infektion?

Behandeln Sie alle Ihre Hunde und Katzen gegen den Flohbandwurm mit Exil No Worm Paste. Verhindern Sie, dass Floheier und Larven sich zu erwachsenen Flöhen entwickeln können. Hierfür verwenden Sie Exil Umgebungsspray.

Bekämpfen Sie die Flöhe auf Ihrem Haustier. Exil bietet hierfür ein umfangreiches Angebot an. Wählen Sie das Produkt, das am besten zu

Ihrem Haustier passt. Wiederholen Sie die Entwurmung in regelmäßigen Abständen.