

Gebrauchsinformation

Pana Veyxal® Salbe

Salbe für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

10 g Salbe enthalten:

Wirkstoffe:

Retinolpalmitat 42.500 I.E.

all-rac-(-)-Tocopherolacetat 25,00 mg

Papain (entsprechend 18,5 mg) 27,75 FIP-U

Chymotrypsin (entsprechend 1,7 mg) 510,00 FIP-U

Trypsin (entsprechend 8,6 mg) 258,00 FIP-U

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

-

Anwendungsgebiete

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen:

Enzymatische Wundreinigung und Förderung der Wundheilung

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen:

Zur Anwendung auf der Haut

Ein- bis mehrmals täglich bis zur Abheilung auf die Wunde auftragen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Wartezeit

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen:

Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Keine.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Die Wirksamkeit von Antibiotika wird unterstützt, insbesondere, wenn infizierte, eitrige, brandige oder jauchige Prozesse vorliegen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel) falls erforderlich:
Keine Angaben.

Inkompatibilitäten:

Keine bekannt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Packungsgrößen

Tube à 20 g, Dose à 150 g