

Packungsbeilage

Adimere Halsband

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS:

DELTATIC, wirkstoffhaltiges Halsband für kleine bis mittelgroße Hunde.
Deltamethrin

NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST:

Zulassungsinhaber:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 - Barcelona
Spanien

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

AB7 SANTE
Chemin des Monges
31450 Deyme
Frankreich

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE:

1 Halsband mit einer Länge von 60 cm (26,40 g) enthält:

Wirkstoff:

Deltamethrin 1,056 g

Sonstige Bestandteile:

Titandioxid (E171) 0,396 g

Weißes wirkstoffhaltiges Halsband

ANWENDUNGSGEBIET(E):

Das Halsband bietet:

- eine repellierende (Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung gegen Sandmücken (*Phlebotomus perniciosus*) für eine Dauer von 5 Monaten.
- eine repellierende Wirkung gegen Gemeine Stechmücken (*Culex pipiens*) für eine Dauer von 6 Monaten.

Das Halsband verhindert:

- den Zeckenbefall für eine Dauer von 6 Monaten.
- den Flohbefall für eine Dauer von 4 Monaten.

Aufgrund der nachgewiesenen repellierenden (Blutmahlzeit verhindernden) Wirkung gegen *Phlebotomus spp.* kann das Halsband als Teil der präventiven Behandlung gegen Leishmaniose und Stechmücken der Spezies *Culex pipiens* angesehen werden.

GEGENANZEIGEN:

Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden.

Nicht bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Deltamethrin oder einem der sonstigen Bestandteile anwenden.

Nicht bei Katzen anwenden.

Nicht bei Hunden mit Hautläsionen anwenden.

NEBENWIRKUNGEN:

In seltenen Fällen wurden die folgenden Nebenwirkungen beobachtet:

- Lokale allergische Reaktionen der Haut (Juckreiz, Rötung, Haarausfall) am Hals oder der Haut im Allgemeinen, was auf eine örtlich begrenzte oder allgemeine Überempfindlichkeitsreaktion hinweisen kann.

- Gastrointestinale Symptome wie Erbrechen, Durchfall und vermehrter Speichelfluss.
- Neuromuskuläre Symptome wie Ataxie und Muskelzittern.

Auch über Verhaltensveränderungen (z. B. Lethargie oder Hyperaktivität), die häufig mit Hautirritationen einhergehen, wurde

in seltenen Fällen berichtet.

Diese Symptome klingen normalerweise innerhalb von 48 Stunden nach Entfernen des Halsbandes ab. Die Behandlung sollte symptomatisch erfolgen, da kein spezifisches Antidot bekannt ist.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder vermuten, dass das Tierarzneimittel keine Wirkung hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

ZIELTIERART(EN):

Hund (0 - 25 kg), für kleine bis mittelgroße Hunde.

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

1 Halsband pro Hund. Das 60 cm lange Halsband ist zur Anwendung bei kleinen bis mittelgroßen Hunden bestimmt. Das Halsband eignet sich für Hunde mit einem Halsumfang von bis zu 48 cm.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG:

Nehmen Sie das Halsband aus der Verpackung und entfernen Sie den Schutzstreifen. Legen Sie das Halsband weder zu locker noch zu eng um den Hals des Tieres. Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollte zwei Finger breit Platz verbleiben. Führen Sie das Ende durch die Schnalle und schneiden Sie das überstehende Ende bis auf 5 cm zur Schnalle ab.

Das Halsband ist mit einem speziellen Sicherheitsverschluss (Anti-Würge-System) ausgestattet. Sollte der Hund mit dem Halsband irgendwo hängen bleiben, reicht seine eigene Kraft aus, um das Halsband zu lösen und sich aus der Situation zu befreien.

WARTEZEIT(EN):

Nicht zutreffend.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE:

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das im Beutel befindliche Halsband lichtgeschützt im Umkarton bzw. in der Dose aufbewahren.

Dieses Tierarzneimittel darf nach dem auf dem Etikett bzw. der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr angewendet werden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

BESONDERE WARNHINWEISE:

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Da die volle Wirksamkeit des Halsbandes erst nach einer Woche eintritt, sollte es vorzugsweise eine Woche vor einem möglichen Befall des Tieres angelegt werden. Zecken werden im Allgemeinen innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgetötet und fallen in der Regel ohne Blutmahlzeit vom Wirt ab. In seltenen Fällen kann es während des Tragens des Halsbandes zum Ansaugen von Zecken kommen. Eine Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken kann daher nicht ausgeschlossen werden. Unter ungünstigen

Bedingungen kann eine Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken oder Sandmücken nicht völlig ausgeschlossen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Der Einfluss von Shampooieren auf die Wirksamkeit des Tierarzneimittels wurde nicht untersucht.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Die versehentliche Einnahme dieses Tierarzneimittels kann zu unerwünschten Nebenwirkungen, einschließlich neurotoxischer Reaktionen, führen. Das Halsband bis zum Gebrauch im ungeöffneten Beutel in der Originalverpackung aufbewahren.

Es ist zu verhindern, dass Kinder das Halsband anfassen, damit spielen, oder es in den Mund nehmen. Eventuelle Reste oder abgeschnittene Stücke des Halsbands müssen sofort entsorgt werden. Nach dem Anlegen des Halsbandes Hände mit kaltem Wasser waschen.

Vermeiden Sie längeren Kontakt mit dem Halsband oder dem Hund, der das Halsband trägt (z. B. wenn der Hund im Bett schlafen darf). Das gilt insbesondere für Kinder.

Rauchen, essen oder trinken Sie nicht während des Umgangs mit dem Halsband. Halten Sie das Halsband fern von Lebensmitteln, Getränken und Tiernahrung.

Bei versehentlicher Einnahme oder dem Verdacht auf Einnahme ist umgehend ärztlicher Rat einzuholen und dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Bei empfindlichen Menschen kann Deltamethrin Überempfindlichkeitsreaktionen

(allergische Reaktionen) hervorrufen. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Deltamethrin sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel und dem behandelten Tier vermeiden. Bei Überempfindlichkeitsreaktionen ärztlichen Rat einholen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Deltamethrin ist giftig für im Wasser lebende Organismen. Entfernen Sie das Halsband vor dem Schwimmen oder Baden des Hundes, um schädliche Auswirkungen auf diese Organismen zu vermeiden. Das Schwimmen des Hundes sollte in den ersten 5 Tagen nach Anlegen des Halsbandes verhindert werden.

Trächtigkeit und Laktation:

Bei trächtigen und säugenden Hündinnen sowie bei Welpen von Müttern, die während der Laktation ein Halsband trugen, wurden keine Sekundärwirkungen beobachtet.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht gleichzeitig mit anderen Ektoparasitika, die Pyrethroide oder Organophosphate enthalten, anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel):

Bei unbeabsichtigter Aufnahme des Halsbandes durch den Hund nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Tierarzt auf. Es können die folgenden Vergiftungserscheinungen auftreten: Unkoordinierte Bewegungen, Zittern, vermehrter Speichelfluss, Erbrechen, Steifheit der hinteren Gliedmaßen. Diese Symptome klingen normalerweise innerhalb von 48 Stunden ab. Bei unbeabsichtigter Aufnahme des Halsbandes durch den Hund ist ein Tierarzt zu konsultieren, ohne eine symptomatische Behandlung einzuleiten. Der Tierarzt wird dann beurteilen, ob eine symptomatische Behandlung notwendig ist.

Inkompatibilitäten:

Nicht zutreffend.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH:

Deltamethrin ist giftig für Bienen, Fische und andere Wasserorganismen. Dieses Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen.

Werfen Sie das gebrauchte Halsband nicht achtlos weg, damit es nicht in die Umwelt oder ins Wasser gelangen kann. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Tierarzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE:

1. Dezember 2020

WEITERE ANGABEN:

Verpackungsgröße(n):

Pappschachtel oder Dose mit 1 Halsband mit einer Länge von 60 cm, in Beutel verpackt.

Pappschachtel oder Dose mit 2 Halsbändern mit einer Länge von je 60 cm, einzeln in Beuteln verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

REG NL 127058

VERSCHREIBUNGSSTATUS:

FREIVERKÄUFLICH

VERTRIEB:

Packungsbeilage

Adimere Halsband

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS:

DELTATIC, wirkstoffhaltiges Halsband für große bis sehr große Hunde.
Deltamethrin

NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST:

Zulassungsinhaber:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 - Barcelona
Spanien

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

AB7 SANTE
Chemin des Monges
31450 Deyme
Frankreich

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE:

1 Halsband mit einer Länge von 75 cm (32,60g) enthält:

Wirkstoff:

Deltamethrin 1,304 g

Sonstige Bestandteile:

Titandioxid (E171) 0,489 g

Weißes wirkstoffhaltiges Halsband

ANWENDUNGSGEBIET(E):

Das Halsband bietet:

- eine repellierende (Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung gegen Sandmücken (*Phlebotomus perniciosus*) für eine Dauer von 5 Monaten.
- eine repellierende Wirkung gegen Gemeine Stechmücken (*Culex pipiens*) für eine Dauer von 6 Monaten.

Das Halsband verhindert:

- den Zeckenbefall für eine Dauer von 6 Monaten.
- den Flohbefall für eine Dauer von 4 Monaten.

Aufgrund der nachgewiesenen repellierenden (Blutmahlzeit verhindernden) Wirkung gegen *Phlebotomus spp.* kann das Halsband als Teil der präventiven Behandlung gegen Leishmaniose und Stechmücken der Spezies *Culex pipiens* angesehen werden.

GEGENANZEIGEN:

Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden.

Nicht bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Deltamethrin oder einem der sonstigen Bestandteile anwenden.

Nicht bei Katzen anwenden.

Nicht bei Hunden mit Hautläsionen anwenden.

NEBENWIRKUNGEN:

In seltenen Fällen wurden die folgenden Nebenwirkungen beobachtet:

- Lokale allergische Reaktionen der Haut (Juckreiz, Rötung, Haarausfall) am Hals oder der Haut im Allgemeinen, was auf eine örtlich begrenzte oder allgemeine Überempfindlichkeitsreaktion hinweisen kann.

- Gastrointestinale Symptome wie Erbrechen, Durchfall und vermehrter Speichelfluss.
- Neuromuskuläre Symptome wie Ataxie und Muskelzittern.

Auch über Verhaltensveränderungen (z. B. Lethargie oder Hyperaktivität), die häufig mit Hautirritationen einhergehen, wurde

in seltenen Fällen berichtet.

Diese Symptome klingen normalerweise innerhalb von 48 Stunden nach Entfernen des Halsbandes ab. Die Behandlung sollte symptomatisch erfolgen, da kein spezifisches Antidot bekannt ist.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder vermuten, dass das Tierarzneimittel keine Wirkung hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

ZIELTIERART(EN):

Hund (> 25 kg), für große bis sehr große Hunde.

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:

1 Halsband pro Hund. Das 75 cm lange Halsband ist zur Anwendung bei großen bis sehr großen Hunden bestimmt.

Das Halsband eignet sich für Hunde mit einem Halsumfang von bis zu 65 cm.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG:

Nehmen Sie das Halsband aus der Verpackung und entfernen Sie den Schutzstreifen. Legen Sie das Halsband weder zu locker noch zu eng um den Hals des Tieres. Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollte zwei Finger breit Platz verbleiben. Führen Sie das Ende durch die Schnalle und schneiden Sie das überstehende Ende bis auf 5 cm zur Schnalle ab.

Das Halsband ist mit einem speziellen Sicherheitsverschluss (Anti-Würge-System) ausgestattet. Sollte der Hund mit dem Halsband irgendwo hängen bleiben, reicht seine eigene Kraft aus, um das Halsband zu lösen und sich aus der Situation zu befreien.

WARTEZEIT(EN):

Nicht zutreffend.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE:

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das im Beutel befindliche Halsband lichtgeschützt im Umkarton bzw. in der Dose aufbewahren.

Dieses Tierarzneimittel darf nach dem auf dem Etikett bzw. der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr angewendet werden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

BESONDERE WARNHINWEISE:

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Da die volle Wirksamkeit des Halsbandes erst nach einer Woche eintritt, sollte es vorzugsweise eine Woche vor einem möglichen Befall des Tieres angelegt werden. Zecken werden im Allgemeinen innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgetötet und fallen in der Regel ohne Blutmahlzeit vom Wirt ab. In seltenen Fällen kann es während des Tragens des Halsbandes zum Ansaugen von Zecken kommen. Eine Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken kann daher nicht ausgeschlossen werden. Unter ungünstigen Bedingungen kann eine Übertragung von Infektionskrankheiten durch Zecken oder Sandmücken nicht völlig ausgeschlossen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Der Einfluss von Shampooieren auf die Wirksamkeit des Tierarzneimittels wurde nicht untersucht.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Die versehentliche Einnahme dieses Tierarzneimittels kann zu unerwünschten Nebenwirkungen, einschließlich neurotoxischer Reaktionen, führen. Das Halsband bis zum Gebrauch im ungeöffneten Beutel in der Originalverpackung aufbewahren.

Es ist zu verhindern, dass Kinder das Halsband anfassen, damit spielen, oder es in den Mund nehmen. Eventuelle Reste oder abgeschnittene Stücke des Halsbands müssen sofort entsorgt werden. Nach dem Anlegen des Halsbandes Hände mit kaltem Wasser waschen.

Vermeiden Sie längeren Kontakt mit dem Halsband oder dem Hund, der das Halsband trägt (z. B. wenn der Hund im Bett schlafen darf). Das gilt insbesondere für Kinder.

Rauchen, essen oder trinken Sie nicht während des Umgangs mit dem Halsband. Halten Sie das Halsband fern von Lebensmitteln, Getränken und Tiernahrung.

Bei versehentlicher Einnahme oder dem Verdacht auf Einnahme ist umgehend ärztlicher Rat einzuholen und dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Bei empfindlichen Menschen kann Deltamethrin Überempfindlichkeitsreaktionen

(allergische Reaktionen) hervorrufen. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Deltamethrin sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel und dem behandelten Tier vermeiden. Bei Überempfindlichkeitsreaktionen ärztlichen Rat einholen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Deltamethrin ist giftig für im Wasser lebende Organismen. Entfernen Sie das Halsband vor dem Schwimmen oder Baden des Hundes, um schädliche Auswirkungen auf diese Organismen zu vermeiden. Das Schwimmen des Hundes sollte in den ersten 5 Tagen nach Anlegen des Halsbandes verhindert werden.

Trächtigkeit und Laktation:

Bei trächtigen und säugenden Hündinnen sowie bei Welpen von Müttern, die während der Laktation ein Halsband trugen, wurden keine Sekundärwirkungen beobachtet.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht gleichzeitig mit anderen Ektoparasitika, die Pyrethroide oder Organophosphate enthalten, anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel):

Bei unbeabsichtigter Aufnahme des Halsbandes durch den Hund nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Tierarzt auf. Es können die folgenden Vergiftungserscheinungen auftreten: Unkoordinierte Bewegungen, Zittern, vermehrter Speichelfluss, Erbrechen, Steifheit der hinteren Gliedmaßen. Diese Symptome klingen normalerweise innerhalb von 48 Stunden ab. Bei unbeabsichtigter Aufnahme des Halsbandes durch den Hund ist ein Tierarzt zu konsultieren, ohne eine symptomatische Behandlung einzuleiten. Der Tierarzt wird dann beurteilen, ob eine symptomatische Behandlung notwendig ist.

Inkompatibilitäten:

Nicht zutreffend.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH:

Deltamethrin ist giftig für Bienen, Fische und andere Wasserorganismen. Dieses Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen.

Werfen Sie das gebrauchte Halsband nicht achtlos weg, damit es nicht in die Umwelt oder ins Wasser gelangen kann. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Tierarzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE:

1. Dezember 2020

WEITERE ANGABEN:Verpackungsgröße(n):

Pappschachtel oder Dose mit 1 Halsband mit einer Länge von 75 cm, in Beutel verpackt.

Pappschachtel oder Dose mit 2 Halsbändern mit einer Länge von je 75 cm, einzeln in Beuteln verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

REG NL 127059**VERSCHREIBUNGSSTATUS:**

FREIVERKÄUFLICH

VERTRIEB: